



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Avstraliya Şırımlı Yastıcası (Icerya purchasi Maskell)



☎ 088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Dişi fərdinin uzunluğu 6 mm olub, bədən ovalşəkilli və çoxsaylı qara tükcüklərlə örtülmüşdür, üst tərəfdən qırmızımtıl-qəhvəyi, alt tərəfdən parlaq narıncı rəngdədir. Erkek fərdin bədən tünd qırmızı, qanadları bozuntul rəngdədir. Digər yastılardan fərqli olaraq, ayaqlarını və qismən hərəkətililiklərini bütün ömrü boyu saxlayırlar. Yazda temperatura 17-18° C-ə çatdıqda yumurtalardan sürfələrin kütləvi çıxması başlayır. Azərbaycanda 2-3 nəsil verməsi qeyd olunur. Ən çox əkin materialı və meyvələrlə yayılırlar.

Mübarizə tədbirləri

- Karantin tədbirlərinə ciddi əməl olunmalı;
- Erkən yazda tumurcuqlar açanadək mineral yağ emulsiyaları ilə ağaclar çilənməli; Zərərverici tut ağaclarında aşkar edilərsə, onların budanıb bir yerdən başqa yerə aparılması qadağan edilməli;
- Yastıcaya qarşı mühüm bioloji mübarizə üsulu kimi yırtıcı radolia böcəyindən istifadə olunur. Bu böcək yastıcanı bütün inkişaf fazalarında məhv edə bilir; Bu zərərverici ilə yoluxmuş sahələrdən əkin materialının daşınması və sirayətlənmiş ölkələrdən əkin materialının gətirilməsi qadağandır.



Zədəsi