



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

DƏYİŞİK İPƏKSARIYAN (*Lymantria dispar*)



088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Bu zərərverici geniş polifaq növ olmaqla dağətəyi rayonlarda yayılıb, bütün meyvə ağaclarını və bir çox enliyarpaqlı meşə ağaclarını-palıdı, qovağı, söyüdü, göyrüşü, toz ağacını, fıstığı, vələsi, cökəni və s. zədələyə bilir.

Mübarizə tədbirləri

- Yarpaqlar töküldükdən sonra ağaclarda olan yumurtalar xüsusi alətlər vasitəsilə qaşınıb bir yerə toplanaraq yandırılmalıdır. Yumurtaların üzərini müalicəvi yağlar və ya neft yağları ilə yağlamaq onların çox hissəsinin həyatilik qabiliyyətini itirməsinə səbəb olur;
- Bağlara həşəratlarla qidalanan quşlar cəlb edilməlidir. Təbiətdə dəyişik ipəksarıyan kəpənəyinin bir çox entomofaqları vardır ki, bunlardan biri də karabid böcəklər cinsinə aid qəşəng böcəklərdir (*Calosoma sycophanta*).

Təsiredici maddəsi Asetasuper (0,15 kq/ha), Supertak (0,06 l/ha), Mosif (0,15-0,2 kq/ha), Mosetam (0,15 kq/ha) və Emavap (0,04-0,08 kq/ha) insektisidlərinin biri ilə çiləmələr aparılmalıdır.



Yetkin fərd



Zədəsi