



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Filloksera (*Viteus vitifoliae*)



☎ 088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Sorucu ağız aparatına malik olan bu zərərverici tənəklərin kök və yarpaqlarının şirəsini sormaqla qidalanır və sürətlə çoxalır. İki əsas forması vardır: bitkinin kökündə yaşayan kök forması və yarpaqlarda yaşayan yarpaq forması.

Fillokseranın kök formasının diş fərdlərinin bədənini 1,2-1,5mm uzunluğunda ovalşəkili olmaqla, sarımtıl-qəhvəyi rəngdədir.

Yay mövsümündə tənəklərin köklərində fillokseranın bütün inkişaf fazalarına rast gəlmək olur. Hava şəraiti və üzümün sortundan asılı olaraq, respublikamızda zərərverici ildə 6-7 nəsil verir.

Mübarizə tədbirləri

Calaqaltılardan istifadə olunmalı, davamlı sortlar əkilməli, sirayətlənmiş tənəklər kökündən çıxarılaraq məhv edilməli, torpaq kimyəvi reagentlərlə dərmanlanmalı və sahəni fillokseradan tam təmizləmək üçün əvvəllər yoluxmuş torpaqlara üzüm qələmləri 5-6 ildən sonra əkilməli, üzümlüklərdə katarovka adlanan aqrotexniki tədbir həyata keçirilməli — Qələmlər dərinə əkilməli, zədələnmiş yuxarı kökcüklər kəsilməli, torpağın üst qatı götürülməli və bu qat qumla əvəz olunmalı, üzümlüklərdə torpaq becərilən zaman istifadə olunan alətlər iş qurtardıqdan sonra təmizlənilib dezinfeksiya olunmalı

Fillokseradan azad zonalara filloksera yoluxan ərazilərdən əkmək üçün əkin materialının gətirilməsi qadağandır.



Zədəsi