



Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Aqrar Təlim Mərkəzi

**Fındıq bitkisinin
becərilməsi üzrə
təqvim planı**

www.axa.gov.az

Fındıq bitkisinin becərilməsi üzrə təqvim planı

Yanvar - Fevral



Havanın temperaturu $<-8^{\circ}\text{C}$ -dən aşağı olan bölgələrdə ağacların donvurmada qorunması üçün tədbirlər görülür. Zərərli orqanizmlərə qarşı qış müalicəsi aparılır. Sertifikatlı tinglərlə yeni bağların salınması həyata keçirilir. Yaşlı bağlarda budama (seyrəltmə və ya cavanlaşdırma), cavan bağlarda formavermə işləri aparılır. Torpağın münbitləşdirilməsi üçün üzvi gübrələr tətbiq edilir.

Mart



Tumurcuqlar açanadək bağlarda yaz budaması aparılır, gövdə ətrafına üzvi və mineral gübrələr verilməklə bellənir, cərgə araları şumlanır. Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə işlərinə başlanılır. Fındığın çoxaldılması (kök pöhrələri və s. vasitəsilə) işləri davam etdirilir. Yeni bağlarda tinglərin əkini və suvarılması həyata keçirilir.

Aprel



Ağaclarda budama, cavanlaşdırma, formavermə (iki illik bağlarda), gövdə ətrafının bellənməsi, gübrələrin verilməsi, cərgə aralarının şumlanması davam etdirilir. Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə işləri davam etdirilir. Torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq suvarma işləri aparılır.

May - İyun



Xəstəlik, zərərverici və alaq otları ilə bağlı müşahidə və mübarizə tədbirləri və suvarma işləri davam etdirilir. Yaşıl budama işləri başlanılır. Yarpaq analizi aparılır, lazımı mineral gübrələr tətbiq edilir.

İyul- Avqust



Xəstəlik, zərərverici və alaq otları ilə bağlı müşahidə və mübarizə tədbirləri, suvarma və yaşıl budama işləri davam etdirilir. Məhsulun yığımına hazırlıq işləri görülür, anbarlarda dezinfeksiya və dezinseksiya işləri aparılır. Tam bioloji yetişkinlik dövründə məhsul yığımı həyata keçirilir. Yığım və daşınmada hava keçirən kisələrdən istifadə olunmalıdır.

Sentyabr



Yığılmış qərzəkli fındıq yaxşı havalandıran quru anbarda saxlanılmalı, gün ərzində bir neçə dəfə qarışdırılmalıdır. Aflotoksinin əmələ gəlməməsi üçün zədəli və çürük meyvələr seçilməlidir. Yeni salınacaq bağlar üçün seçilmiş sahələrdə üzvi gübrələrin verilməsi, plantaj şumu, malalama işləri aparılmaqla əkinə hazırlıqlara başlanılmalıdır.

Oktyabr



Cavan bağlarda cərgə aralarının ağır və ya yüngül diskli mala ilə yumşaldılması və frez çəkilməsi, sertifikatlı tinglərlə yeni fındıq bağlarının salınması həyata keçirilir. Yaşlı bağlarda budama (seyrəltmə və ya cavanlaşdırma), cavan bağlarda formavermə işlərinə başlanılır. Torpağın münbitləşdirilməsi üçün üzvi gübrələr tətbiq edilir. Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri yerinə yetirilir.

Noyab - Dekabr



Ting əkini, fındığın çoxaldılması (kök pöhrələri və s. vasitəsilə) işləri, bağlarda cərgə aralarının ağır və ya yüngül diskli mala ilə yumşaldılması və frez çəkilməsi, yaşlı bağlarda budama (seyrəltmə və ya cavanlaşdırma), cavan bağlarda formavermə işləri, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri aparılır. Torpaq analizinin nəticələri nəzərə alınmaqla üzvi (peyin) və mineral (fosfor, kalium) gübrələrin verilməsi, ağaclarda payız budaması həyata keçirilir. Sahəyə dondurma suyu verilir.



Fındıq bitkisinin mühafizə sxemi

Zərərli orqanizmlər	Aprel	May	İyun	İyul	Avqust
Moniloz Dəngil, Unlu şəh və s	Carbendazim 500q/l- (75 q/100 litr suya), Difenonazole 250 q/l- (0,2 l/ha), Propineb 700 q/l (1,9-2,0 l/ha) və ya Penconazole 100 q/l – (0,3-0,4 l/ha) tərkibli preparatların biri ilə				
Bakterial ləkəlilik Bakterial xərçəng	Xəstəliyin ilkin simptomları göründükdə tərkibində mis birləşmələri olan (1 %-li bordo məhlulu, 0,3 %-li mis-xloroksidi, 0,4 %-li kuprozan) preparatlardan biri ilə çiləmə aparılır				
Amerika ağ kəpənəyi Fındıq qurdu	Amerika ağ kəpənəyinə qarşı Diflobenzuron 480 q/l (20 ml/100 l suya), Fındıq qurduna qarşı Alfa cypermethrin 100q/(l 0,4 l/ha) və ya İndoxacarb 150 q/l – (0,45 l/ha)				
Fındıq uzunburunu Fındıq güvəsi Qəhvəyi mərmər bağacıq		Karbosulfan 250 q/l – 1,0-1,25 l/ha, Dimethoat (0,8-2,0 l/ha), deltamethrin (0,05-0,125 l/ha) işçi məhlul 800-1200 l/ha			
Pambıq sovkası	I və II nəslə qarşı birinci dərmanlamayı təsiredici maddələri Lamda-cyhalothrin(0,1 l/ha) + Primiphos metil (0,8l/ha) qarışığı ilə, ikinci çiləməni Lamda-cyhalothrin (0,1 l/ha) + Lufeniron (0,3 l/ha) və s.				
Alaq otları		Diguat 150 q/l – (1,5-2,0 l/ha), Glyphosate 500 q/l – (2,0-4,0 l/ha)			

