



Aqrar Xidmətlər  
Agentliyi

# FİTONOMUS

(Phytonomus variabilis.)



088-588  
axa.gov.az



## Zərərverici haqqında

Fitonomus ilk yazda (mart ayında) inkişafa başlamış yonca bitkisi ilə qidalanmağa başlayır. Qidalanma nəticəsində yarpaqlarda deşiklərin açılması və ya kənarlarının yeyilməsi, yarpaq saplağında və gövdədə isə çökəkliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bir dişi fərd 2500-ə qədər yumurta qoya bilir. Fitonomusun əsas sürfə mərhələsi daha təhlükəli hesab edilir və daha çox zərər vurur. Yumurtadan çıxmış sürfələr təpə tumurcuqları içərisinə daxil olaraq qidalanmasını qapalı həyat tərzində davam etdirir. İnkişafını davam etdirən sürfələr sonralar açıq qidalanma şəraitinə keçirlər. Qidalanma nəticəsində yem məhsulu kəmiyyətə azalır və onun keyfiyyəti aşağı düşür.

## Mübarizə tədbirləri

- Yazda yoncalıqlar ağır malalarla malalanmalı;
- İmkan daxilində yonca dibindən çalınmalı;
- Sirayətlənmiş sahədə toxum üçün 2-ci çalım yonca istifadə olunmalı.

**Təsiredici maddəsi** 200-400 l/ha Sipermetrin (250 qr/l), 200-300 l/ha Zeta-sipermetrin, 200-400l/ha Dimetoat (400qr/l) olan preparatların biri ilə kimyəvi mübarizə aparıla bilər.



**Yetkin fərd**



**Zədəsi**