



Aqrar Xidmətlər  
Agentliyi

## Klasterosporioz (*Wilsonomyces carpophilus* (Leveille) (Adaskaveq, Oqawa & Butler)



☎ 088-588  
axa.gov.az



## Xəstəlik haqqında

Clasterosporiasis məhsuldarlığın keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərini aşağı salan zərərli bitki xəstəliyidir. Bəzi illərdə daş meyvə bitkilərinin yoluxması 30%-i, meyvələrin infeksiyası isə 60%-i keçə bilər. Xəstə yarpaqlar azotun eyni vaxtda artması ilə şəkər və xlorofilin tərkibini azaldır. Yoluxmuş meyvələr daha az çəki və şəkər tərkibi ilə xarakterizə olunur .

**Xəstəliyin simptomları :** Meyvə ağaclarının vegetativ və generativ orqanlarında görünür. Yarpaqlarda yuvarlaqlaşdırılmış, diametri 2-5 mm-ə qədər açıq qəhvəyi rəngli moruq və ya qırmızı-qəhvəyi haşiyəli ləkələr əmələ gəlir. 7-14 gündən sonra ləkələr düşür və yarpaq bıçaqlarında deşiklər əmələ gəlir. Güclü zədələnmə ilə ləkələr birləşir və düşür. Yoluxmuş yarpaqlar qismən, bəzən isə tamamilə quruyur və ətrafa uçar. Qönçələr və tumurcuqlarda simptomlar parlaq narıncı-qırmızı kiçik ləkələr şəklində görünür. Ləkələr inkişaf etdikcə, onlar çatlayır və yapışqan bir kütlə ifraz edirlər, saqqız adlanan, tumurcuqlardan aşağı axan və onların üzərində şüşəvari kütlə kimi bərkiyir, açıq sarıdan qara-qəhvəyi rənglərə boyanır.

## Mübarizə tədbirləri

### Aqrotexniki:

Təsirlənmiş tumurcuqların kəsilməsi;  
yarpaq zibilinin dərin şumlanması

### Kimyəvi:

Ağacların triazol sinfinin funksidləri, qeyri-üzvi maddələr, mis birləşmələri və başqaları ilə müalicəsi.

**Kimyəvi pestisidlər:** Bordo mayesi



**Zədəsi**