



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Pambıq mənəsi (*Aphis gossypii*) (Glover)



☎088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Pambıq mənənələri bitkinin ən zərif hissələrində - budağın təpə hissəsində və cavan yarpaqlarında məskunlaşaraq xortumu ilə onları deşib şirə sorur və toxumalara tüpürcək vəzlərinin ifrazatını yeridirlər. Nəticədə toxumalar dağılır, cücərti zədələndikdə təpə tumurcuq məhv olur. Bir qədər sonra zədələnmiş yarpaqlar burulur, qırışır və bir qismi tökülürlər. Generativ orqanların formalaşdığı dövrdə mənənə ilə zədələnmə qönçə və qoza başlanğıclarının tökülməsinə səbəb olur, tökülməyən qozalar isə az məhsuldar olurlar. İtki əksər hallarda 20%-dən yuxarı olur. Qozaların açdığı dövrdə mənənə ifrazatı ilə pambıq mahlıcını çirkləndirir. İfrazat üzərində inkişaf edən qurum göbələkləri pambıq liflərinin qaralmasına və xarab olmasına səbəb olurlar

Mübarizə tədbirləri

Mədəni bitkilərin vegetasiyaları arasındakı dövrdə bostan mənənəsi alağ otları üzərində yaşayır və qidalanırlar. Bu səbəbdən alağ otları tam məhv edilməlidir. Mənənə ilə bioloji mübarizədə yırtıcı afidimiza, Aphidiidae fəsiləsindən olan parazitlərdən və qismən Cycloneda limbifer, Micromus angulatus, Chrysopa spp., Leis dimidiata sürfələrindən istifadə edilməklə mübarizə aparılır. Pambıq bitkisinin 100 yarpağı üzərində mənənələr 50 -dən çox olarsa, sorucu zərərverici əleyhinə dimethoat tərkibli preparatları ilə sahə dərmanlanmalıdır. Mənənə əleyhinə asetamiprid tərkibli insektisidləri çox səmərəlidirlər.



Zərərverici