



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Pambıq Sovkası (*Helicoverpa armigera*)(Hübner)



☎ 088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Pambıq sovkasının tırtılı, əsasən qönçə, çiçək, qoza başlanğıcı və qozalara zərər vuraraq, məhsulun əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olur. Daxildən yeyilmiş qönçələr tökülür. Zədələnmiş çiçəklərin əksər hissəsi qoza vermir, bəziləri böyümədən qalır, qozalarda lifin keyfiyyəti pisləşir. Pambıq sovkası torpağın 4-10 sm dərinliyində pup fazasında qışlayır. Bir dişi kəpənək 500-3000-ə qədər yumurta qoya bilir. Pambıq əkinlərində sovkə 3 nəsil verir.

Mübarizə tədbirləri

Aqrotexniki mübarizə: Qış şumu və qış suvarması aparılmalı, sovkaya davamlı sortlardan istifadə olunmalı,

Cərgəarası kultivasiya aparılmalı, kolların dibi kətmənlənməli, normaya uyğun yemləmə gübrəsi verilməli,

Pambıq kollarında ucurma vaxtında həyata keçirilməli və bitki qalıqları sahədən çıxarılmalıdır

Bioloji mübarizə: Sovkanın təbii düşmənləri trixoqramma və habrobrakon kimi faydalı həşəratlardan istifadə edilir

Trixoqrammanın sahəyə 1-ci buraxılışı feromon tutucularda 2-3 kəpənək müşahidə edildikdən 5-6 gün sonra, 2-ci buraxılışı isə birincidən 6-7 gün sonra həyata keçirilir

Hər nəslə qarşı 3-4 dəfə və hər hektara 60-70 min fərd olmaqla trixoqramma tətbiq edilir

Hər nəslə qarşı 3 dəfə və hər hektara 0.5-2.0 min fərd olmaqla habrobrakon tətbiq edilir;



Yetkn fərd