



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Qarğıdalı Gövdə Kəpənəyi (*Pyrausta nubilalis* Hb)



☎088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Qarğıdalı gövdə kəpənəyi qarğıdalının əsas zərərvericisidir. Dişlərin qanadları açıq sarı rəngdədir, üzərində qəhvəyi rəngli ləkə və dişli zolaqlar var. Bədən uzunluğu 13-15 mm-dir.

Tırtıllar 16 ayaqlı olub, sarımtıl bozdur. İri yaşlı tırtıllar mədəni və əlaq otları gövdəsi içərisində özlərinə yuva düzəldərək qışlayır. May ayının ortalarından (tem 15-16) tırtıllar puplaşmaya başlayır. Tırtılların puplaşmadan əvvəl kəpənəyin çölə çıxması üçün gövdəsində yol açır.

Puplaşma normal getməsi üçün, rütubət yüksək olmalıdır. Mayın axırları 1-ci nəsil kəpənəklər iyulun əvvəlinə qədər uçuş edir, 2-ci nəsil avqustun əvvəlindən sentyabrın əvvəlinə qədər uçuş edir. Azərbaycanda 2 nəsil verir. Kəpənəklər gecə fəal olur. Uzağa uçmur, pupdan çıxdıqları yer ətrafında 4-5 gündən sonra yumurta qoymağa başlayır. Sıx sahələrdə yarpaq altına 2-7 yumurta olmaqla topa halda yumurta qoyur. Bir diş 250-350 yumurta qoyur. Çıxan tırtıllar yarpaq damarı içərisinə girir, qidalanmasını və yaşamasını davam etdirir. Tırtıllar tez-tez bir bitkidən digərinə keçir. Payızda onlar bitkinin gövdəsinin aşağı hissəsində toplanır və burada diapauzaya gedir. Kütləvi çoxalması yüksək rütubətli vaxtlara təsadüf edir.

Mübarizə tədbirləri

Aqrotexniki :

- Dərinləmə işləri zamanı tırtıl qalmasını qarşısını almaq
- Dondurma şumu tırtılları məhv etmək

Bioloji:

- Trioxqamma

Kimyəvi mübarizə

- Deltametrin tərkibli maddələrdən
- Fosfor üzvi birləşmələrlə mübarizə aparmaq lazımdır.



Zərərverici