



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Şabalıdda Gövdə Yanığı (*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr)



☎088-588
axa.gov.az




Zərərverici haqqında

Bitkinin kök, gövdə və budaqlarında inkişaf edir. Gövdə və budaqlarda qabığın nazik, hamar hissəsində qırmızı-qəhvəyi, sarı-çəhrayı ləkələr olur. qabığı yoluxmuş hissəsində göbələyin dağınıq, bəzən göbələyin topa halında konidi stromaları əmələ gəlir. Qalın qabıq gövdələrdə stromalar çatlarla müşahidə olunur. Bir müddən sonra gövdə və budaqların yoluxma yerlərində müxtəlif tipli yaralar (açıq, qapalı, çatlamış şişlər formasında) əmələ gəlir.

Mübarizə tədbirləri

Qış aylarında xəstəliyə 30-60% yoluxmuş ağacların budaqları zədələrdən 25 sm aşağı olmaqla kəsilməli və yandırılmalı, 60 %-dən çox yoluxmuş və tam qurumuş ağaclar isə kök boğazından yuxarı kəsilməli və kötüyün yerüstü hissəsi də daxil olmaqla yandırılmalıdır. Ağacın özünü yenidən bərpa etməsi üçün ona 15 gündən bir 3 dəfə karbendazim, benomil, epoksikonazol tərkibli fungisidlər çilənməli və ya gövdələrin inyeksiyası həyata keçirilməlidir. Mis oksixloridin 5%-li yara yerlərini bıçaqla təmizləyib yaxmalı

Təsiredici maddəsi: Bioloji mübarizədə hipovirulent növlər istifadə olunmalıdır



Zədəsi

