



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Sarı Pas Xəstəliyi (*Puccinia striiformis*) (Westendorp)



☎ 088-588
axa.gov.az



Xəstəlik haqqında

Sarı pas xəstəliyinin törədiciyi *Puccinia striiformis* West. göbələyidir. Xəstəliyin səciyyəvi əlaməti bitkinin yarpaqlarının üst hissəsində yarpaq uzunluğunu sarı rəngdə 1-2 sm uzunluğunda, 0,5-1,0 mm enində nazik xətvəli sarı rəngli ləkələrin-pustulların əmələ gəlməsidir. Həmin ləkələr xəstəlik inkişaf etdikcə böyüyür və yarpağın epidermisi altında olan pustullar dağılaraq, açıq-sarı rəngli spor kütləsi-konidlər xaricə tökülür. Uredosporlar deyilən bu konidlər toz şəklində yayılaraq, yenidən ətrafda olan sağlam bitkilərə sirayət olunur. Yarpaqlarla bərabər bitkinin digər orqanları-gövdəsi, sünbülü və qılçıqları da xəstəliyə tutulur.

Mübarizə tədbirləri

- xəstəliyə davamlı sortlardan istifadə edilməsi;
- dərin şum aparılmalı, payızda taxıl cücərtilərinin əmələ gəlməsinə yol verilməməli;
- növbəli əkinlərin aparılması və sələf bitkilərinin tətbiqi;
- payızda taxıl əkiləcək sahələrin şum altına fosfor-kalium, erkən yazda isə yemləmə şəklində azot gübrəsi verilməli;
- taxıl əlaqlarına qarşı vaxtında mübarizə aparılmalı;
- səpinqabağı toxumlar dərmanlanmalı

Kimyəvi mübarizə

Mancozeb (800 q/kq3,5 l/ha), Tebuconazole (250 q/kq 0,75 kq/ha) preparatlarından istifadə edilir



Xəstəliyin taxılda zədəsi