



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

SARI SARMAŞIQ (cuscuta)



088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Ən geniş yayılmış növü tarla sarı sarmaşığıdır. Azərbaycanın bütün bölgələrində yayılmışdır və 200 -dən çox bitki növünə zərər vurur. Tarla sarı sarmaşığı istisevər bitkidir. Bir toxumdan cücərmiş tarla sarmaşığı 20 mindən çox toxum verir Gövdə qırıqlarından vegetativ yolla arta bilər. Yetişmiş toxumlar torpaqda 8-10 il cücərmə qabiliyyətini saxlayır.

Mübarizə tədbirləri

- Karantin tədbirlərinə ciddi əməl edilməli,
- Dərin şum;
- Sahənin bitki qalıqlarından təmizlənməsi;
- Alaq otlarına qarşı mübarizə;
- Növbəli əkin;
- Cərgələrə bəzəmə.

Təsiredici maddəsi Propizamid 50%-li herbisidlərdən istifadə olunur. Preparatın hektara məsarif norması yonca əkinlərində 3.0 l/ha, şəkər çuğundurunda 3-4 l/ha, noxud, nut və qarışıq əkinlərdə 4 l/ha təşkil edir.



Zədəsi