



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

SİTRUS AĞQANADLISI (Dialeurodes citri Ashm)



088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Zərərverici respublikanın bir çox bölgələrində, əsasən də Astara və Lənkəran rayonlarında müşahidə olunur. Sitrus ağqanadlısı bitkiyə çiçəkləmə, meyvəvermə, məhsul yığımından sonrakı və vegetativ orqanların böyümə mərhələlərində ziyan vurur. Dişi fərdlər yumurtalarını koma halında cavan yarpaqların alt hissəsinə və bəzən gövdə üzərinə qoyur. Zərərvericinin sürfələri yarpaqların şirəsini sormaqla onların saralmasına və qıvrılmasına səbəb olur. Zərərverici əkin materialı, külək vasitəsilə və bir ağacdən digərinə uçmaqla yayılır.

Mübarizə tədbirləri

- Karantin tədbirlərinə əməl edilməli Zərərvericinin yayıldığı ocaqlardan qonşu regionlara ağac tinglərinin və qələmlərin aparılması qadağan edilməli;
- Bioloji mübarizə tətbiqi olaraq sitrus ağqanadlısı əleyhinə 9 növ aşersoniya göbələyindən istifadə olunur.

Təsiredici maddəsi Abamektin 18 qr/l—(25ml/100 lsuya) Tiametoksam 250q/kq-(0.1-0. kq/ha), Asetamiprid 200 q/kq-(300q/ha), İmidacloprid 30.5%-(0.35l/ha) preparatlarından istifadə olunması məqsədəuyğundur.



Yetkin fərd



Zədəsi