



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

TİKANLI QUŞÜZÜMÜ (*Solanum rostratum* Dunal.)



088-588
axa.gov.az



Zərərli orqanizm haqqında

Hündürlüyü 30 -100 sm olan olmaqla tikanla sıx örtülmüş bitkidir. Şaxələnmiş mil kökü 3 m-dək dərinliyə gedir. Gövdəsi silindirik, oduncaqlı, çox budaqlı, bozuntul rənglidir. Yarpaqları növbəli, uzun saplaqlı, dərin ikili lələkvəri bölünmüş, uzunluğu 5-10 sm-dir. Çiçəkləri beş hissəli, salxımdadır. Bitki iyun-sentyabrda çiçəkləyir, avqust-oktyabrda meyvə verir. Yetişdikdə meyvə çatlayır. Bir bitkidə 2000-ə dək toxum olur. Quşüzümünün təzə yığılmış toxumları cücərmir, onlar 5-6 ay ərzində bioloji dinclik vəziyyətində olur, ancaq torpaqda qışladıqdan sonra cücərir.

Mübarizə tədbirləri

- Tikanlı quşüzümü toxumları ilə zibillənmiş əkin materiallarının əkilməsi qadağan edilməlidir;
- Toxum materialı təmizlənməli, sahəyə yalnız yanmış peyin verilməlidir;
Bu alaq otu ilə güclü zibillənmiş sahə dincə qoyulmalı, sonra isə
- həmin sahədə 2 il payızlıq taxıl əkilməlidir. Taxıl yığıldıqdan sonra bitki qalıqları məhv edilməlidir.

Təsiredici maddəsi Dimetil amin duzu (1,6-2,0 l/ha), Tribenuron (10-15qr/ha), 2,4 D amin (1,6-2,0 l/ha) olan preparatlar ilə kimyəvi mübarizə aparıla bilər. Tikanlı quşüzümü inkişafının ilk mərhələlərində 2,4 D qrup herbisidlərə daha həssasdır. n 240 q/l --- 0.4 l/ha



Tikanlı quşüzümü