




Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Üzümdə Antraknoz (*Gloeosporium ampelophagum* Sacc.)



☎ 088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Xəstəlik törədici isti və rütubətli havada bir neçə gün müddətində əhəmiyyətli dərəcədə məhsul itkisinə səbəb olur. Xəstəlik meyvələrin üzrəində 5-15 mm ölçüdə batıq, yastı, yumru və ya oval nəm ləkələr yaradır. Bütün yarpaq qəhvəyi olur, quruyur və bir müddət sobra tökülür. Antraknoz bitkinin yarpaq və gövdəsinin üzrəində də müşahidə olunmasına baxmayaraq əsasən yetişmiş meyvələr üzrəində güclü inkişaf edir. Patogen üçün 16-200C temperatur və havanın nisbi rütubətinin 70-80% həddində olması önəmlidir.

Mübarizə tədbirləri

Havalanmanı kifayət qədər təmin etmək üçün optimal bitki sıxlığına əməl edilməli, meyvələrin yetişməsi fazasında qruntda optimal nəmlik gözlənilməli, suvarılma günün birinci yarısında aparılmalı, ehtiyac duyulduqda fungusidlərlə çiləmə aparıla bilər. Antraknozun ilk əlamətində ləkələnmiş yarpaqları və xəstəlikdən ciddi şəkildə təsirlənən kolları kökündən qoparın.

Təsiredici maddəsi:

Məhsul yığımına hələ bir ay əvvəl varsa, daha təsirli kimyəvi maddələrdən istifadə edilə bilər: mis tərkibli bir funqisid və ya koloidal kükürd məhlulu



Yetkin fərd



Zədəsi