



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

YAPONİYA ÇÖPVARI ÇANAQLI YASTICASI (*Lopholeucaspis japonica* Cockerell)



☎ 088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Sitrus və dekorativ bitkiləri, həmçinin xurma, heyva, alma, armud, əncir, gavalı ağaclarını, qızılgül, yasəmən, çay kollarını və s. bitkiləri zədələyir. Yaponiya çöpvari qalxanlı yastıcasının dişi fərdinin bədəninin uzunluğu 1 mm-ə yaxındır, çanağının uzunluğu isə 1,6-1,8 mm-dir. Bədəni sarı və ya limon rəngindədir. Erkək fərdlər qanadlıdır, uzun bığcıqları və bir cüt qanadları var. Çanağı uzunsov olub qəhvəyi rəngdədir. İl ərzində 2 nəsil verir.

Mübarizə tədbirləri

Karantin tədbirlərinə ciddi əməl edilməli, zərərverici yayılmış ərazidən digər ərazilərə əkin və calaq materialının aparılmasına icazə verilməməli payız-qış dövründə ağacların gövdə və budaqlarının qalıqları dəmir fırçalarla qaşınaraq yastıcadan təmizlənməli, quru budaqlar kəsilərək yandırılmalı erkən yazda tumurcuqlar açanadək (gecələr temperatur 4°C-dən, orta gündəlik temperatur isə 7,5°C-dən yuxarı olduqda) mineral yağ emulsiyaları (Prepa rat 30 və s.) ağaclara çilənməli, vegetasiya müddətində zərərvericiyə qarşı aşağıdakı tərkibli preparatları növbələşdirməklə istifadə olunmaları məsləhət görülür:

- a) fosfor üzvi birləşmələrdən - dime toat tərkibli
- b) malation tərkibli preparatlardan
- c) tiametoksam tərkibli; asetamiprid tərkibli; imidakloprid tərkibli
- d) peritroid birləşmələrindən-deltametrin tərkibli



Zədəsi