



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

YOVŞANYARPAQLI AMBROZİYA (*Ambrosia artemisiifolia* L)



088-588
axa.gov.az



Zərərli orqanizm haqqında

Xarici görünüşü bir qədər çətənə və yovşanı xatırladır. Gövdəsi dik olub, yuxarı hissəsi süpürgəvari şaxəlidir. Yarpaqları üst tərəfdən tünd, alt tərəfdən isə açıq yaşıl rəngli, üzəri isə qısa tükcüklərlə örtülü olur. Növün identifikasiyası zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, ambroziya 2-4 əsl yarpaq fazasında adi yovşana çox oxşayır. Başlıca fərqləndirici əlaməti ambroziyanın gövdəsinin tükcüklərlə örtülü olmasıdır.

Mübarizə tədbirləri

- Geniş sirayətlənmiş ərazilərdə toxumverməni əngəlləmək üçün mövsüm ərzində bitkini 3-5 dəfə biçilməli, biçinin hündürlüyü 2-6 sm həddində olmalıdır. Qönçələmə dövründə biçmə daha səmərəlidir;
- Ambroziyanın toxum verməsinin qarşısının alınması məqsədilə dənli taxıl bitkilərinin məhsulu yığılandan dərhal sonra kövşənlik çevrilməli (8-10 sm dərinlikdə) və ya ön kotancıqla kotanla 25-30 sm dərinlikdə şumlanmalı, əkin qabağı kultivasiya aparılmalı, tək-tək qalan əlaq otları mexaniki üsulla məhv edilməlidir.

Təsiredici maddəsi Müxtəlif əkinlərində 2,4 D amin duzu (1,6-2,0 l/ha), hektofermin (1,6-2,0 l/ha), veed killer (1,6-2,0 l/ha) tətbiq edilir. Becərilməyən torpaqlarda ambroziyanın 4-6 əsl yarpaq fazasında raundap (3-6 l/ha) və ya arsenal (2-2,5 l/ha) herbisidi səmərəlidir.



Zərərli orqanizm